


## Tympanoplastik

Hvis et hul i en trommehinde ikke vil hele af sig selv, kan en operation blive nødvendig. Hullet lappes med bruskhinde taget fra patienten selv. Øret skal helst være tørt, det vil sige at det ikke skal flyde, når man forsøger operation.

Operationen foregår i fuld bedøvelse givet af klinikkens speciallæge i anæstesiologi.

Til operationen skal medbringes en ledsager, der sidder hos dig efter operationen og senere kører dig hjem.

Man må ikke selv køre bil lige efter operationen.



## Før operationen

Af sikkerhedshensyn skal mavesækken være tom ved operationen, dvs:

Man må ikke spise de sidste 6 timer før operationstidspunktet.

Der må drikkes lidt VAND indtil 2 timer før operationen.

Astmaspray må benyttes som vanligt før operation.

- Blodfortyndende medicin må ikke tages i 5 dage før operationen .
- Bruger du hjerte- eller blodtryksmedicin skal du aftale nærmere med ørelægen



### **Blodtryksmedicin på operationsdagen**

	<b>Styrke</b>	<b>Morgen</b>
<b>Tbl.</b>		
<b>Tbl.</b>		

## Operationen

Ved operationen renses hullets kant op og dækkes med bruskhinde taget fra brusken foran øregangsåbningen.

Bruskhindeklappen understøttes af et selvopløseligt materiale, der placeres såvel i mellemøret, som i øregangen. Yderligere sikring sker med små gazestrimler i øregangen. Til sidst anbringes et lille stykke vat i øregangen for at opsuge evt. blod og sårvæske. Efter operationen er øregangen derfor tilstoppet og hørelsen væsentligt nedsat.



## Efterforløbet

De første dage efter operationen kan der være lette smerter fra øret eller fra det sted lappen er taget fra .

Smerter behandles med Panodil.

Vattet yderst i øregangen kan forsigtigt skiftes, hvis det bliver snavset – pas på ikke at trække gazen med ud af øregangen.

Efter 1 uge fjernes eventuelle tråde og efter 14 dage fjernes gazen hos ørelægen. Lappen vil nu være begyndt at vokse sammen med den oprindelige trommehinde. Det indlagte understøttelsesmateriale vil gradvist opløses, og lykkedes operationen vil trommehinden genvinde sin spændstighed og efterhånden svinge frit, så hørelsen igen vender tilbage.

- Børn skal være hjemme fra skole/børnehave den første uge efter operationen.
- Man skal holde sig i ro de første 14 dage efter operationen.
- Stillesiddende arbejde kan genoptages 2 uger efter operationen.
- Fysisk hårdt arbejde kan genoptages 4-6 uger efter operationen.
- Ca. 1½ måned efter operationen kontrolleres hørelsen med en høreprøve, og det anbefales at man først herefter genoptager ”vild leg” som f.eks. hop i trampolin, fodboldspil o.lign.

*Ved øreflåd, uventede smerter eller svimmelhed efter operationen kontaktes klinikken telefonisk på tlf. 5853 3854.*