

Smertestillende behandling efter operation

	Styrke	Morgen	Middag	Aften	Nat.
Tbl. Panodil					
Tbl. Ibumetin					

Septumplastik

("næseskillevægsoperation")



*Peter Tingsgaard Ph.d.
Speciallæge i øre- næse- halssygdomme
Korsgade 6, 1 4200 Slagelse
Patienttlf.: 5853 3854
Fax: 5850 3932
www.tingsgaard.dk*


Septumplastik (operation for skæv næseskillevæg el. lukning af hul på denne)

Ved en septumplastik korrigeres skævheder eller huller på næseskillevæggen inde i næsen

Operationen udføres gennem højre næsebor, og der efterlades ingen synlige ar på huden.

Til operationen skal medbringes en ledsager, der sidder hos dig efter operationen og kører dig hjem.

Du må ikke køre bil lige efter operationen.



Før operationen

Af sikkerhedshensyn skal mavesækken være tom ved operationen, dvs:

Man må ikke spise de sidste 6 timer før operationstidspunktet.


Der må drikkes lidt vand indtil 2 timer før operationen.

Astmaspray må benyttes som vanligt før operation.

- Blodfortyndende medicin må ikke tages i 5 dage før operationen .
- Bruger du hjerte- eller blodtryksmedicin skal du aftale nærmere med ørelægen

Blodtryksmedicin på operationsdagen

	Styrke	Morgen
Tbl.		
Tbl.		



Operationen

Operationen foregår i fuld bedøvelse givet af klinikkens speciallæge i anæstesiologi.

Til støtte af den opererede næseskillevæg oplægges der i nogle tilfælde plastikplader, som syes fast i næsehulen.

Evt. plasticplader vil blive fjernet efter ca. 1 uge.

Efter operationen

Du vil blive observeret i klinikken til din tilstand er stabil. Derefter vil du og din ledsager kunne forlade klinikken til rekreation hjemme.

Vi anbefaler mindst 1 uges rekreation.

Senere på dagen kontakter vi dig for at høre til dit velbefindende.

Det er helt normalt, at det kan sivbløde fra næsen. I visse tilfælde kan dine slimhinder hæve op, det kan derfor være vanskeligt at trække vejret gennem næsen. Det kan derfor være en fordel, at sove med eleveret hovedgærde.

Næsen vil kunne tåle små stød efter ca. 5 uger.

Efter operationen vil det være nødvendigt med mindst 1 uges rekreation.

Kommer der frisk blødning fra næsen efter operationen kan du sutte på is, og se om det standser blødningen. Fortsætter blødningen kan du i dagtiden kontakte klinikken.

Udenfor klinikkens åbningstid kontaktes ørelægen på tlf. 2531 0013.

Opstår der feber og/eller forværring af smerter kontaktes klinikken eller egen læge i dagtiden.

