


Adenoidektomi

Adenoidektomi betyder fjernelse af de adenoide vegetationer eller ”polypper” der sidder i næsesvælget oppe bag den bløde gane. Operationen kommer på tale ved gentagne, langvarige mellemøreproblemer eller vedvarende besværet/ophævet vejrtrækning gennem næsen. De forstørrede og ofte inficerede polypper fjernes ved udskrabning gennem munden. Operationen foregår i fuld bedøvelse givet af klinikkens speciallæge i anæstesiologi.



Før operationen

Mavesækken skal være tom før bedøvelsen.

Det er farligt at bedøve børn med noget som helst i mavesækken derfor:

Må man ikke spise de sidste 6 timer før operationen.

Man må drikke vand og KUN VAND op til 2 timer før operationen.

Ammemælk må gives senest 4 timer før operationen.

Astmaspray må benyttes som vanligt før operation

Børn skal ledsages af 2 voksne.

Der skal 2 timer før operationen gives smertestillende medicin.

Smertestillende 2 timer før operation

Stikpille Panodil á	mg	stk.
Disp. tbl. Pamol Flash á	mg	stk.


Efter operationen

Barnet vil blive observeret i klinikken, indtil tilstand er stabil, og mundhulen er kontrolleret for blødning.

Efter operationen føles drøblen mere fyldig end normalt (vandig hævelse), og tungen tykkere end før (efter trykket fra mundspærre).

Sidst på dagen kontakter vi jer telefonisk for at høre til barnets velbefindende.

Efter operationen skal barnet være hjemme i mindst 2 døgn.



Kommer der frisk blødning fra halsen efter operationen, er det vigtigt at man uanset tidspunktet på døgnet kontakter ørelægen eller vagthavende ørelæge på Køge Sygehus mhp. behandling af blødningen. Opstår der feber og/eller forværring af smerter i dagene efter operationen kontaktes klinikken eller egen læge.

Når I kommer hjem må barnet drikke og spise is, yoghurt o. lign. – senere på dagen, hvis der ikke har været problemer må barnet spise normalt. Første døgn er det dog bedst med kold og blød kost. Det er vigtigt, at I bruger den ordinerede smertestillende medicin det første døgn.

Smertestillende behandling efter operation

	Morgen	Middag	Aften	Nat.
Styrke				
Dispergibel tablet Pamol Flash				
Tbl./stikpille Panodil				